

Số: 08 /TB - TTDVNN

Thanh Miên, ngày 28 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO PHÒNG TRỪ DỊCH HẠI VỤ CHIÊM XUÂN NĂM 2021
(Từ ngày 29/4 đến ngày 05/5 năm 2021)

- Kính gửi: - Chi cục BVTV Hải Dương;
- Thường trực huyện ủy, HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;
- Các ngành, UBND các xã, thị trấn;
- Các HTX dịch vụ nông nghiệp; Các đại lý buôn bán thuốc ,

BVTV.

I/ TÌNH HÌNH THỜI TIẾT, CÂY TRỒNG

1. Tình hình thời tiết:

Thời tiết từ tháng 03 đến nay liên tục có mưa nhỏ, mưa phùn, ẩm độ không khí cao thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng phát triển đồng thời cũng thuận lợi cho một số đối tượng dịch hại gây hại.

2. Cây trồng:

- Cây lúa: đang giai đoạn phân hóa đòng – đòng già, một số diện tích lúa nếp đang giai đoạn thấp tho trở - trở bông;
- Nhãn, vải: đang giai đoạn đậu quả - đỏ vai;
- Ngô: đang giai đoạn tròng – trở cờ, phun râu, thu hoạch
- Dưa chuột: đang giai đoạn tròng - ra hoa, thu quả;
- Dưa lê: phát triển thân lá – ra hoa, đậu quả;
- Bầu bí, mướp: đang giai đoạn tròng – phát triển thân lá, ra hoa đậu quả;
- Rau các loại: tròng - phát triển thân, lá, thu hoạch.

II. TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 27/4/2021

1. Cây lúa:

- Sâu cuốn lá nhỏ: Trưởng thành vũ hóa rải rác từ giữa tháng 4 đến nay. Mật độ trung bình từ 0,2 – 0,5 con/m², chỗ cao từ 2- 3 con/m². Mật độ trứng trung bình từ 10-20 quả/m², chỗ cao từ 20-40 quả/m².
- Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy đang xuất hiện rải rác, mật độ trung bình 1-3 con/khóm, chỗ cao 5- 10 con/khóm.
 - Bệnh đạo ôn lá: hiện nay bệnh đang phát sinh và gây hại trên trà lúa muộn đang giai đoạn cuối đẻ nhánh – phân hóa đòng.
 - Bệnh khô vằn: Bệnh xuất hiện ở các ruộng xanh tốt, lúa đã kín hàng đặc biệt là trên Nếp, Bắc thơm số 7,...
 - Bệnh vàng lá sinh lý: bệnh gây hại sau đợt không khí lạnh đặc biệt là các giống mẫn cảm, các ruộng chăm bón không cân đối.
 - Chuột: chuột gây hại tăng các diện tích lúa gần làng, ven đường đi, gần khu chuyển đổi đặc biệt là diện tích lúa gieo vãi, ruộng cạn nước bị gây hại tăng hơn.
- Ngoài ra còn có các đối tượng khác như bọ trĩ, bọ xít đen, rệp xanh, ruồi đục nõn: gây hại với mật độ thấp.

2. Nhãn, vải:

- Bệnh sương mai nhãn, vải tiếp tục gây hại, sâu đục cuống quả vải gây hại vải giai đoạn vào mã;

- Sâu đo, bọ xít, rệp muội, rệp sáp gây hại với tỷ lệ thấp.

3. Dưa chuột:

- Bệnh giả sương mai, phấn trắng: gây hại tăng trên dưa đang giai đoạn thu quả.

Bọ trĩ, bọ phấn, sâu xanh: gây hại dưa giai đoạn trồng – phát triển thân lá.

4. Ngô: Sâu keo mùa thu, sâu đục thân, bệnh gỉ sắt, bệnh đốm lá.

III/ DỰ BÁO TÌNH HÌNH DỊCH HẠI ĐẾN NGÀY 06/5/2021

1. Cây lúa:

- Bệnh đạo ôn lá: Bệnh gây hại giảm khi cây lúa chuyển sang giai đoạn phân hóa đòng – làm đòng.

- Bệnh đạo ôn cổ bông gây hại lúa giai đoạn thấp tho trở - chắc xanh nếu gặp điều kiện thời tiết có mưa, ẩm u, ẩm độ không khí cao, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn đặc biệt là các giống nhiễm, các ruộng bị đạo ôn lá.

- Sâu cuốn lá nhỏ: Dự kiến sâu non nở rộ từ ngày 30/4-4/5 mật độ sâu cao ở những ruộng xanh tốt, ven làng, gần đường đi, những ruộng có mật độ trồng thành cao.

- Rầy nâu, rầy lưng trắng: gây hại cục bộ mật độ thấp.

- Bệnh khô vằn: Bệnh tiếp tục gây hại và leo cao lên các lá phía trên

- Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: bệnh sẽ phát sinh và gây hại sau các trận mưa, giống đặc biệt là các giống nhiễm như Bắc thơm số 7, BC15,...

2. Nhãn, vải:

- Bệnh sương mai, thán thư: Bệnh tiếp tục gây hại nhãn, vải đậu quả khi gặp điều kiện thời tiết mưa ẩm.

- Sâu đo, bọ xít, sâu đục cuống quả vải: gặm ăn, chích hút các bộ phận non của cây quả non làm giảm số lượng và chất lượng quả. Sâu đo, bọ xít sẽ tiếp tục phát sinh gây hại trong thời gian tới. Sâu đục cuống quả gây hại vải giai đoạn đỏ vai – chín.

3. Dưa chuột, dưa lê, bầu bí:

- Bệnh giả sương mai: tiếp tục gây hại tăng trên những ruộng dưa chuột giai đoạn ra hoa, đậu quả, thu hoạch.

- Bệnh phấn trắng, bệnh héo vàng, héo xanh có khả năng gây hại trong thời gian tới.

- Bọ phấn, bọ trĩ: gây hại dưa giai đoạn trồng – thu hoạch

4. Ngô:

- Sâu keo mùa thu: Sâu gây hại ngô giai đoạn từ 3 lá – trở cờ, phun râu.

- Sâu đục thân ngô: sâu gây hại giai đoạn xoắn nõn – trở cờ.

IV. BIỆN PHÁP PHÒNG TRỪ

1. Bệnh đạo ôn cổ bông:

- Bệnh đạo ôn cổ bông sẽ gây hại các giống nhiễm như Nếp, Q5, BC15, TBR225, ... các ruộng bị bệnh đạo ôn khi cây lúa giai đoạn đòng già – chắc xanh khi thời tiết có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, ẩm độ cao, nhiệt độ chênh lệch ngày đêm lớn, các ruộng đang bị bệnh. Nếu không phun trừ tốt sẽ gây bông bạc làm giảm năng suất hoặc bị nặng có thể không cho thu hoạch. Vì vậy để phòng trừ tốt bệnh đạo ôn cổ bông cần phun lần 1 khi lúa thấp tho trở và phun lại lần 2 sau lần 1 từ 7-10 ngày.

- Đối với bệnh đạo ôn lá bị nặng: cần tiến hành vơ bỏ lá già, lá bệnh sau đó mới tiến hành phun trừ thì hiệu quả sẽ cao hơn. Có thể phun lại lần 2 sau lần 1 từ 5-7 ngày cũng cho hiệu quả tốt hơn. Lưu ý: nên phun thuốc khi lá lúa đã khô hoặc khi phun thuốc gặp mưa cần phun lại ngay sẽ cho hiệu quả trừ bệnh tốt hơn.

Dùng các loại thuốc như: Ninja; Beam, Filia, Roshow, Katana, Fuji-one, Nativo, ..

2. Sâu cuốn lá nhỏ:

Thời gian phun trừ từ 30/4 – 4/5 tập trung trên trà sớm, trên các ruộng xanh tốt, gần làng, gần đường đi, các ruộng có mật độ trưởng thành cao.

Dùng các thuốc như: Solo, Clever, Voliam Tango, Virtako, Các thuốc có hoạt chất Emamectin,...

3. Rầy nâu, rầy lưng trắng: Rầy sẽ phát sinh và gây hại từ nay đến cuối vụ. Vì vậy các ngành, các địa phương cần hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện rầy nếu thấy rầy cám từ 20 con/khóm trở lên thì tiến hành phun trừ ngay. Dùng các thuốc như Chess, Chetduc, Vua rầy, Cherry,...

4. Bệnh khô vằn:

Bệnh phát sinh gây hại tăng trên tất cả các trà, giống lúa và gây hại đến cuối vụ. Vì vậy các địa phương cần khuyến cáo nông dân tăng cường kiểm tra đồng ruộng phát hiện bệnh đặc biệt các ruộng xanh tốt, các ruộng có chế độ nước không thường xuyên thường bị bệnh cao hơn. Khi thấy bệnh hại 10% đánh trở lên thì tiến hành phun trừ ngay.

5. Bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn: bệnh phát sinh và gây hại sau các trận mưa, giông trên các giống nhiễm như Bắc thơm số 7, Q5, BC15,... vì vậy các ngành, các địa phương cần hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng và phun phòng sau các trận mưa giông. Dùng các thuốc như: Visen, Xantocin, Statner, Kasumil,....

6. Bệnh lem lép hạt: bệnh gây hại khi cây lúa giai đoạn trổ bông – chắc xanh khi gặp điều kiện thời tiết ẩm, nóng, ẩm độ không khí cao làm cho hạt lúa bị lép, đen ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng gạo. Vì vậy để phòng trừ tốt bệnh này nông dân nên phun trừ lần 1 khi lúa thấp thoáng trổ và phun lại lần 2 khi lúa trổ xong. Dùng các thuốc như: Nevo, Tiltsuper, Amistatop,....

7. Sâu keo mùa thu, sâu đục thân ngô:

- Sâu keo mùa thu gây hại mạnh khi cây ngô giai đoạn 3 – xoắn nõn ăn tước lá, mất ngọn ảnh hưởng đến sinh trưởng, mật độ cây. Đây là đối tượng sâu mới sức gây hại mạnh vì vậy bà con cần theo dõi và phun trừ kịp thời khi sâu tuổi nhỏ: dùng các thuốc như: Solo, Clever, Voliam Tango, Virtako,...

- sâu đục thân ngô: gây hại giai đoạn cây ngô xoắn nõn – phun râu đặc biệt sâu gây đục vào bắp ảnh hưởng tới năng suất và chất lượng bắp. Dùng các thuốc như: Voliam Tango, Virtako,...

8. Bệnh gỉ sắt ngô: Bệnh gây tăng khi cây ngô giai đoạn xoắn nõn – thu hoạch. Bệnh gây hại làm cho cây ngô giảm khả năng quang hợp, giảm khả năng tích lũy dinh dưỡng về bắp làm bắp nhỏ, giảm chất lượng. Vì vậy để phòng trừ tốt bệnh này nông dân cần phun trừ sớm khi bệnh chớm xuất hiện. Dùng các thuốc như: Tolusa, Amistatop, Tiltsuper,...

9. Bệnh sương mai nhãn vải, giả sương mai, phấn trắng dưa chuột, dưa lê:

- Bệnh gây hại tăng giai đoạn cây ra hoa, đậu quả khi gặp điều kiện mưa ẩm. Vì vậy cần chú ý phun phòng bệnh giai đoạn ra hoa – đậu quả.

Dùng các thuốc như: Ridomil Gold, Ricide, Aliette, Profiler,... phun lúc chiều mát.

- Bệnh phấn trắng: gây hại trên dưa chuột, dưa lê, cây họ bầu bí, hoa hồng, rau ngót,... nhất là khi gặp điều kiện lạnh, ẩm độ không khí cao (điều kiện thời tiết hiện nay) làm giảm khả năng quang hợp, cây sinh trưởng kém, bệnh nặng làm giảm năng suất nghiêm trọng hoặc cây có thể chết. Vì vậy bà con lưu ý cần phát hiện bệnh sớm và phun trừ kịp thời. Có thể sử dụng các thuốc như Manage, Map Hero, Anvil, Score, Thần dược, M8,...

10. Sâu đo, bọ xít hại nhãn vải, sâu đục cuống vải:

Bọ xít, sâu đo đối tượng chính gặm khuyết hoa và gây rụng hoa, quả non. Vì vậy nông dân cần kiểm tra khi thấy mật độ sâu từ 1 – 2 con/cành thì tiến hành phun thuốc trừ sâu.

Dùng các thuốc như: Virtako, Aremec, Angun, Dylan,.... Phun vào lúc chiều mát.

- Đối với sâu đục cuống quả vải: Thời gian phun trừ từ ngày 25-30/4 tập trung trên các vườn vải sớm và chính vụ. Dùng các thuốc như: Prevathon, Voliam Tàngo, Virtako,...

11. Chuột:

Các địa phương cần đôn đốc các tổ, đội diệt chuột cần kiểm tra các khu đồng bị chuột gây hại cần tiết hành tổ chức diệt chuột bổ sung bằng các biện pháp như rải mồi bả, bẫy bán nguyệt ở nơi chuột thường di chuyển tránh để chuột phát sinh và di chuyển ra diện rộng. Đặc biệt từ giữa tháng 4 là thời kỳ chuột sinh sản làm các hàng tạm ngay gần bờ để sinh sản và nuôi con vì vậy các tổ diệt chuột nên tăng cường đánh bắt thủ công và rải mồi ở các bờ ruộng, bờ máng,...

Ngoài ra còn một số đối tượng như nhện đỏ, sâu vẽ bùa hại cây có múi, sâu xanh, sâu đo, bọ nhảy trên rau,..../.

Nơi nhận:

Như kính gửi;

Lưu.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Lê Việt Thanh